Série 1 : Noyaux, masse et énergie



EXERCICE 1:

1-Repond par vrai au faux:

- a. Tous les noyaux radioactifs sont instables.
- b. Une réaction nucléaire conserve le nombre total de nucléons.
- c. En radioactivité, γ (gamma) désigne un neutron.
- d. La constante de temps d'un noyau radioactif est la durée que met un échantillon de noyaux radioactifs pour que la moitié de ses noyaux initialement présents se soient désintégrés.
- e. Plus un noyau est stable plus son énergie de liaison par nucléon est petite.
- f. La désintégration β^+ se produit lorsqu'un neutron se transforme en proton.
- g. La période radioactive d'un noyau est définie comme $T = \ln(2) / \lambda$.
- h. La fusion nucléaire est généralement une réaction endothermique
- i. La masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons
- j. La période radioactive dépend de la quantité initiale de l'échantillon.
- k. Le rayonnement γ modifie le nombre de protons dans le noyau.
- l. La radioactivité peut être influencée par des variations de pression ou de température.
- m. Les particules α sont arrêtées par une simple feuille de papier.
- n. L'énergie de liaison par nucléon est un indicateur de la stabilité d'un noyau.
- o. Les noyaux très lourds se stabilisent en perdant des protons par radioactivité.
- p. La constante radioactive a la dimension du temps.
- q. L'activité d'un échantillon s'exprime en seconde.
- r. Pour les noyaux lourds et selon la courbe d'Aston, plus un noyau est lourd, moins il est stable.
- s. Le défaut de masse s'exprime en MeV
- t. Les isotopes d'un même élément ont des énergies de liaison différentes
- u. Lors d'une fusion nucléaire, la masse totale des réactifs est égale à celle des produits
- v. Le rendement énergétique de la fission nucléaire surpasse celui de la fusion nucléaire

EXERCICE 2:

Le nucléide d'Uranium $^{238}_{92}$ U se transforme en polonium $^{206}_{84}$ Po au cours d'une chaine de désintégration spontanées du type α et β - selon l'équation suivante : $^{238}_{92}$ U \rightarrow $^{206}_{84}$ Po + x. α + y. β -

1. Reconnaître les particules α et β et déterminer les coefficients x et y

Au cours de cette chaine de désintégrations, le noyau de polonium $^{210}_{84}$ Po se désintègre en un noyau du plomb $^{206}_{82}$ Pb

- **2.** Ecrire l'équation de cette transformation et préciser le type de désintégration et la nature de la particule émise.
- 3. Calculer en MeV et en J l'énergie libérée au cours de cette transformation nucléaire
- **4.** Représenter le bilan énergétique de cette transformation en utilisant le diagramme énergétique Soit N_0 le nombre de noyaux de polonium radioactif à l'instant t_0 =0, et N le nombre de particules restantes à l'instant t_0 =1. Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenus pour cette transformation nucléaire à des dates bien précises :

t (jours)	0	40	80	120	160	200	240
N/N ₀	1	0,82	0,67	0,55	0,45	0,37	0,30

- **5.** Tracer la courbe $-Ln(N/N_0) = f(t)$ et utilisant l'échelle 1cm pour 20 jours et 1cm pour 0,1 sur l'axe des ordonnées.
- **6.** Déterminer graphiquement la constante radioactive λ et en déduire la demi-vie $t_{1/2}$ du polonium 210.

7. On considère un échantillon contenant des noyaux de polonium $^{210}_{84}$ Po de masse $m_0 = 10g$ à l'instant t = 0, calculer la masse des noyaux restants à l'instant t = 45 jours.

Données: $m(^{206}_{82}Pb) = 206,0385 u$; $m(^{210}_{84}Po) = 210,0482 u$; $m(^{4}_{2}He) = 4,00150 u$

EXERCICE 3:

Dans une centrale nucléaire, les noyaux d'uranium $^{235}_{92}U$ subissent la fission sous le choc d'un neutron lent. Un des nombreux processus possibles conduit à la formation d'un noyau de lanthane $^{144}_{57}La$, d'un noyau de brome $^{88}_{35}Br$ et de plusieurs neutrons.

- 1- Définissez l'énergie de liaison d'un noyau.
- 2- Donnez son expression littérale son calcul.
- **3-** Calculez, en MeV, l'énergie de liaison d'un noyau $^{235}_{92}U$
- 4- Calculez l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau.
- **5-** Ecrivez l'équation de la réaction de fission étudiée.
- **6-** Exprimez l'énergie libérée par la fission d'un noyau $^{235}_{92}U$ en fonction des énergies de liaison par nucléon du noyau père et des noyaux fils et calculez la valeur de cette énergie en MeV.
- 7- Dans le cœur de la centrale, de nombreuses autres réactions de fission du noyau $^{235}_{92}U$ se produisent. La perte de masse est, en moyenne, de 0,200 u par noyau.
- 7-1- Calculez, en MeV, l'énergie moyenne libérée par la fission d'un noyau.
- **7-2-** Calculez, en joule, l'énergie moyenne libérée par une mole de noyaux $^{235}_{92}U$
- **7-3-** Dans une centrale nucléaire, l'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique. Une centrale fournit une puissance électrique moyenne $P_e = 1000$ MW avec un rendement r = 25%.
- 7-3-1- Quelle est sa puissance nucléaire Pn consommée?
- 7-3-2- Quelle est, en joule, l'énergie nucléaire consommée chaque année ?

Données : - Constante d'Avogadro : NA = 6,02.10²³ mol⁻¹

- $-1\mu = 1,66055. \ 10^{-27} \text{ kg}$ et $1 \text{MeV} = 1,602. \ 10^{-13} \text{ J}$
- Masse d'un proton : $m_p = 1,0073\mu$; Masse d'un neutron : $m_n = 1,0087\mu$
- Célérité de la lumière dans le vide : $c = 2,998 \times 10^8 \, \text{m.s}_{-1}$
- Masse du noyau d'uranium 235 : $m({}^{235}_{92}U) = 235,0134\mu$
- Energies de liaison par nucléon : $E\iota/A(^{144}_{57}La)$ = 8,28 MeV/nucléon ; $E\iota/A(^{88}_{35}Br)$ = 8,56 MeV/nucléon

EXERCICE 4:

La réaction d'une centrale nucléaire fonctionne à l'aide de l'uranium enrichi constitué d'un mélange de P = 3% de l'uranium ^{235}U fissible et de P' = 97% de l'uranium ^{238}U non fissible.

P et P' sont des pourcentages massiques.

L'énergie thermonucléaire dans ce réacteur est produite par la réaction suivante :

$${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{94}_{38}Sr + {}^{140}_{54}Xe + 2 {}^{1}_{0}n$$

Donnés:

$$m(^{140}\text{Xe}) = 139,8920u$$
;
 $m(^{94}\text{Sr}) = 93,8945u$;
 $m(^{235}U) = 234,9935u$

$$m(n) = 1,0087u; 1 \text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}; 1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{MeV} \cdot \text{c}^{-2}.$$

Avec un rendement r=25%, cette centrale fournit une puissance électrique moyenne $P_s=295MW$.

- 1- Calculer en MeV et en Joule, l'énergie nucléaire $|\Delta E_0|$ libérée par la fission de $m_0=1g$ de ^{235}U .
- 2- Montrer que la masse m d'uranium enrichi, consommée par le réacteur pendant une durée $\Delta t = 24h$ peut s'écrire : $m = \frac{m_0 P_e \cdot \Delta t}{r \cdot P_c | \Delta E_o|}$. Calculer m.